

Graines de Erable de Montpellier- *Acer monspessulanum*

[1ACE0117]

Semences non traitées de *Acer monspessulanum*

Caractéristiques principales

- Nom latin :** *Acer monspessulanum*
Nom vernaculaire : Erable de Montpellier
Variété : type
Lieu de culture : Haies & Bordures végétales, Jardin d'ornement, Jardin Couleurs d'automne
Hauteur : 5 à 8 m
Emprise au sol : 5 à 8 m
Type de plante : Arbuste, Arbre
Port : Buissonnant, Etalé, Arrondi
Type de feuillage : Caduque
Période de floraison : Printemps
Feuilles : Feuilles vert foncé de 3 à 5 cm de long, palmatilobées, 3 lobes arrondis, ovales, coriaces, lustrées, opposées.
Flours : Floraison de mars à avril. Grappes pendantes de petites fleurs jaune-vert.
Fruits : Fructification en juillet. Fruits ailés rouges, groupés par 2.
Autres : Ecorce foncée.
Température minimale (Rusticité) : de -20°C à -15°C

Culture

- Exposition :** Ensoleillé, Mi-ombre
Substrat / Sol : Bien drainant, Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie), Riche, fertile & humifère
Arrosage (plante adulte) : 2/5 Arrosage moyen
Maladies / Ravageurs : Chenilles, Alternariose (brûlure du feuillage - maladie cryptogamique), Pourridié (armillaire - champignon), Cochenilles, Acariens, Maladies cryptogamiques
Culture en pot : En bonsaï

Semis

- Facilité semis :** 3 Difficile - voir aussi les conseils de semis généraux dans le menu
Mode de semis : **Semis sous abri :** au début du printemps, entre 10°C et 15°C
 Trempage : 24h à 48h, eau température ambiante (renouveler l'eau toutes les 12h), jusqu'au gonflement des graines
 Stratification à chaud : 1 mois, à 20°C
 Stratification à froid : 1 à 3 mois
 Substrat : mélange de terreau spécial semis et de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle transparent jusqu'à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre
 Profondeur : le diamètre de la graine, tasser légèrement le substrat
 Couvert en surface : 3 mm de vermiculite
 Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
 Repiquage individuel : les plants de plus de 4 feuilles
 Hivernage sous abri : pendant 2 ou 3 hivers
 Rempotage : quand le système racinaire est bien développé
 Plantation en place : en automne, les plants de 50 cm
Semis pleine terre en pépinière : en automne
Durée de germination : Semis sous abri : de 1 mois à plus de 1 an, lente et irrégulière
 Si pas de germination : 2ème stratification à froid
 Semis pleine terre en pépinière : au 1er ou 2ème printemps

En savoir plus

- Origine :** Zone méditerranéenne
Intérêt : Bonsaï