

Graines de Acer shirasawanum

[1ACE0118]



Semences non traitées de Erable du Japon Palmatifolium, Erable Full Moon



Caractéristiques principales

Nom latin :	Acer shirasawanum Palmatifolium, Acer japonicum Palmatifolium
Nom vernaculaire :	Érable de Shirasawa, Érable du Japon, Full Moon Japanese maple
	Variété : Palmatifolium
Lieu de culture :	Jardin d'ornement
Hauteur :	2 à 4 m
Emprise au sol :	2 à 4 m
Type de plante :	Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires)
Port :	Dressé (érigé)
Type de feuillage :	Caducue
Période de floraison :	Printemps
Feuilles :	Grandes feuilles vert clair au printemps, vert foncé marginé de jaune-orange-rouge en été, puis jaune-orange-rouge à l'automne, palmées, 7 à 11 lobes, fortement dentées, opposées.
Flours :	Floraison de mars à avril. Petites fleurs.
Fruits :	Graines ailées, groupés par 2.
Température minimale (Rusticité) :	de -20°C à -15°C

Culture

Exposition :	Ensoleillé
Substrat / Sol :	Limoneux
Arrosage (plante adulte) :	2/5 Arrosage moyen
Maladies / Ravageurs :	Pourridié (armillaire - champignon)
Culture au jardin :	Paillez le pied avant l'hiver pour le protéger du froid.
Culture en pot :	En bonsaï

Semis

Facilité semis :	3 Difficile - voir aussi les conseils de semis généraux dans le menu
Mode de semis :	Semis sous abri : au printemps, à partir de 20°C Trempage : 24h à 48h, eau température ambiante (renouveler l'eau toutes les 12h), jusqu'au gonflement des graines Stratification à chaud : 1 à 4 mois, à 20°C Stratification à froid : 1 à 4 mois Substrat : mélange de terreau spécial semis et de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle transparent jusqu'à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre Besoin de lumière pour germer : oui Profondeur : semis à la surface, sans couvrir les graines de substrat, tasser légèrement le substrat Couvert en surface : 3 mm de vermiculite Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct Repiquage individuel : les plants de plus de 4 feuilles Hivernage sous abri : pendant 2 ou 3 hivers Plantation en place : en automne Germination : 1 mois à plus de 1 an, lente et irrégulière Si pas de germination : 2ème stratification à froid Semis pleine terre en pépinière : en automne Germination : au 1er ou 2ème printemps Taux de germination : environ 30 à 50 %

En savoir plus

Origine :	Japon
Intérêt :	Bonsaï