

## Graines de Érable du Japon Sekimori

[1ACE0120]



Semences non traitées de Acer palmatum (Dissectum)



## Caractéristiques principales

- Nom latin :** Acer palmatum (Dissectum)  
**Nom vernaculaire :** Érable du Japon, Érable palmé ciselé, Smoother japanese maple, Weeping japanese maple, Cutleaf japanese maple  
**Variété :** Sekimori (Seki Mori)  
**Lieu de culture :** Culture en pot - Balcon & Terrasse, Jardin d'ornement, Jardin Couleurs d'automne  
**Hauteur :** 1 à 2 m  
**Emprise au sol :** 1 à 2 m  
**Type de plante :** Arbuste, Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires)  
**Port :** Étalaé, Arrondi, Pleureur (retombant)  
**Type de feuillage :** Caduque  
**Période de floraison :** Printemps  
**Feuilles :** Feuilles de 5 à 10 cm de long, vert clair au printemps, vert moyen en été, jaune d'or orangé à rouge en automne, opposées, palmées, profondément découpées en 5 à 7 lobes, très finement ciselés.  
**Flours :** Floraison en avril et mai. Très petites fleurs rouge pourpré groupées en petits bouquets pendants.  
**Fruits :** Fructification en août et septembre. Fruits rouges, aux ailes recourbées, groupés par 2.  
**Température minimale (Rusticité) :** de -20°C à -15°C  
**Recommandations :** **Attention :** sensible au Verticillium, éviter la proximité des champs de pommes de terre car vecteurs de cette maladie.

## Culture

- Exposition :** Ensoleillé, A l'abri du vent, Mi-ombre  
**Substrat / Sol :** Bien drainant, Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie), Riche, fertile & humifère, Profond  
**Arrosage (plante adulte) :** 2/5 Arrosage moyen  
**Maladies / Ravageurs :** Chenilles, Maladies cryptogamiques, Cochenilles, Acariens, Pourridié (armillaire - champignon)  
**Culture au jardin :** Les fortes chaleurs provoquent la brûlure des feuilles, qui tombent rapidement. Paillez, arrosez et douchez les feuilles les soirs de forte chaleur.  
 Paillez le pied avant l'hiver pour le protéger du froid.  
 Taille hivernale limitée à un équilibrage de la ramure.  
**Culture en pot :** Oui

## Semis

- Facilité semis :** 3 Difficile - voir aussi les conseils de semis généraux dans le menu  
**Mode de semis :** **Semis sous abri :** au printemps, entre 18°C et 20°C  
 Trempage : 48h (renouveler l'eau toutes les 12h), jusqu'au gonflement des graines  
 Stratification à froid : 1 à 4 mois  
 Substrat : mélange de terreau spécial semis et de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle transparent jusqu'à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre  
 Profondeur : le diamètre de la graine, tasser légèrement le substrat  
 Couvert en surface : 3 mm de vermiculite  
 Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct  
 Repiquage individuel : les plants de plus de 4 feuilles  
 Hivernage sous abri : pendant 2 ou 3 hivers  
 Rempotage : quand le système racinaire est bien développé  
 Plantation en place : en automne, les plants de 50 cm  
**Semis pleine terre en pépinière :** en automne  
**Durée de germination :** Semis sous abri : de 1 mois à plus de 1 an, lente et irrégulière  
 Si pas de germination : 2ème stratification à froid  
 Semis pleine terre en pépinière : au 1er ou 2ème printemps  
**Taux de germination :** environ 30 %

## En savoir plus

- Origine :** Japon  
**Intérêt :** Plante exceptionnelle (de collection), Silhouette remarquable, Bonsaï