

## Graines de Cotonéaster rampant

[1COT0101]



Semences non traitées de Cotoneaster horizontalis



## Caractéristiques principales

- Nom latin :** Cotoneaster horizontalis  
**Nom vernaculaire :** Cotonéaster rampant, Cotonéaster horizontal, Rockspray Cotoneaster  
**Variété :** type  
**Lieu de culture :** Culture en pot - Balcon & Terrasse, Jardin ami Abeilles & Papillons (plantes mellifères), Jardin ami Oiseaux, Jardin de rocaille, Jardin Couleurs d'automne, Jardin d'ornement  
**Hauteur :** 50 à 100 c  
**Emprise au sol :** 100 à 150 cm  
**Type de plante :** Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires), Se ressème tout seul, Arbuste, Plante traçante, Plante à stolons (tiges secondaires qui produisent d'autres plants)  
**Port :** Buissonnant, Rampant, Tapissant, Etalé  
**Type de feuillage :** Semi-persistante  
**Période de floraison :** Printemps  
**Feuilles :** Feuilles vert foncé brillant, rouge orangé en automne, entières, ovales, alternes.  
**Fleurs :** Floraison en mai. Petites fleurs blanc rosé, 5 pétales, solitaires ou groupées par 2, boutons floraux rose vif.  
**Fruits :** Fructification en septembre, dès l'âge de 3 ans. Drupes rouge vif, non comestibles, 2 à 4 graines par fruit.  
**Autres :** Branches disposées en arrêtes de poissons, s'enracinant quand elles touchent le sol, formant un tapis couvre-sol.  
**Température minimale (Rusticité) :** inférieure à -20°C  
**Recommandations :** Peut devenir envahissant : les branches s'enracinent facilement quand elles touchent le sol et les graines des fruits qui tombent au printemps germent facilement.  
**Attention :** les baies sont toxiques pour l'humain, elles provoquent des troubles digestifs et des irritations en cas d'ingestion.

## Culture

- Exposition :** Mi-ombre, Ensoleillé, Plein soleil, A l'abri du vent  
**Substrat / Sol :** Riche, fertile & humifère, Bien drainant, Tolère le calcaire  
**Arrosage (plante adulte) :** 2/5 Arrosage moyen  
**Maladies / Ravageurs :** Pucerons, Pourridié (armillaire - champignon), Cochenilles  
**Culture au jardin :** Taillez les plants en mars ou en avril si vous voulez qu'ils gardent une forme compacte.  
**Culture en pot :** Oui

## Semis

- Facilité semis :** 3 Difficile - voir aussi les conseils de semis généraux dans le menu  
**Mode de semis :** **Semis sous abri :** au début du printemps, 24°C le jour et 12°C la nuit  
 Trempage : 24h à 48h, eau chaude (renouveler l'eau toutes les 12h), jusqu'au gonflement des graines  
 Stratification à chaud : 3 mois, à 20°C  
 Stratification à froid : 3 à 6 mois  
 Substrat : mélange de terreau spécial semis et de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle transparent jusqu'à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre  
 Besoin de lumière pour germer : oui  
 Profondeur : semis à la surface, sans couvrir les graines de substrat, tasser légèrement le substrat  
 Couvert en surface : 3 mm de vermiculite  
 Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct  
 Repiquage individuel : les plants manipulables  
 Hivernage sous abri : pendant 1 ou 2 hivers  
 Rempotage : quand le système racinaire est bien développé  
 Acclimatation à l'extérieur : pendant 1 à 2 semaines  
 Plantation en place : après les dernières gelées, quand le système racinaire est bien développé  
**Semis direct en place :** en automne  
**Durée de germination :** Semis sous abri : 1 à 6 mois, parfois 18 mois, lente et irrégulière  
 Si pas de germination : 2ème stratification à froid  
 Semis direct en place : au 1er ou 2ème printemps  
**Taux de germination :** environ 50 %

## En savoir plus

- Origine :** Chine  
**Intérêt :** Silhouette remarquable, Plante couvre-sol, Plante amie des auxiliaires du jardin, Bonsaï