

Graines de Acer palmatum Atropurpureum

[1ACE0107]



Erable Pourpre du Japon Semences non traitées



Caractéristiques principales

- Nom vernaculaire :** Erable de Japon Rouge, Erable de Japon à Feuilles Rouges, Erable de Japon Pourpre, Redleaf Japanese Maple
Variété : Atropurpuream (Rouge ou Pourpre)
- Lieu de culture :** Culture en pot - Balcon & Terrasse, *Jardin tempéré
- Hauteur :** 8 m
- Emprise au sol :** 10 m
- Type de plante :** Arbre
- Port :** Arrondi
- Type de feuillage :** Caduque
- Feuilles :** Rondes, lobées, rouge-pourpre, passant au rouge vif à l'automne
- Flours :** Très petites, rouge pourpre, en corymbes pendants
- Fruits :** Rouges, ailés
- Autres :** Écorce rouge
- Recommandations :** Sensible au Verticillium, éviter la proximité des champs de pommes de terre car vecteurs de cette maladie.

Culture

- Exposition :** Pleine lumière, Mi-ombre
- Substrat / Sol :** Acide, Profond, *Humifère, Humide (garde très longtemps l'humidité), Bien drainant
- Arrosage (plante adulte) :** 2/5 Arrosage moyen
- Maladies / Ravageurs :** Chenilles, *Armillaire (pourridié - champignon), Cochenilles, Acariens, Alternariose (brûlure du feuillage - maladie cryptogamique)
- Culture au jardin :** L'arrosage de cet arbre doit-être régulier en été mais il faut éviter de détremper le sol en hiver, les gelures des racines étant généralement fatales.
Magnifique en bonsaï.
- Culture en pot :** Oui
- Conseils du comptoir des graines :** Dans les régions du sud, protégez du soleil direct en été.

Semis

- Facilité semis :** 3 Difficile - voir aussi les conseils de semis généraux dans le menu
- Mode de semis :** Trempage : 24h à 48h, eau tiède (renouveler l'eau toutes les 12h), jusqu'au gonflement des graines
 Stratification à froid : 2 à 5 mois
 Semis sous abri : au début du printemps
 Température de semis : entre 18°C et 20°C (pas plus de 25°C)
 Substrat : mélange de terreau spécial semis et de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle transparent jusqu'à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre
 Profondeur : le diamètre de la graine, tasser légèrement le substrat
 Couvert en surface : 3 mm de vermiculite
 Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
 Repiquage individuel : les plants de plus de 4 feuilles
 Hivernage sous abri : pendant 2 ou 3 hivers
 Rempotage : quand le système racinaire est bien développé
 Acclimatation à l'extérieur : pendant 1 à 2 semaines
 Plantation en place : après les dernières gelées
Germination : 1 à 2 mois, lente et irrégulière
 Si pas de germination : 2ème stratification à froid
Taux de germination : environ 30 à 60 %

En savoir plus

- Origine :** *Asie orientale
- Intérêt :** *Bonsaï d'extérieur, Ecorce remarquable, *Feuillage, *Feuillage d'automne